

УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ:

директор клиники ООО «Варикоза нет»

Юр. адрес 644070, г. Омск,

ул. Иркутская, д.68, корп.1, лит.А, пом. 3П.

Адрес филиала 150001, г. Ярославль,

ул. Нагорная, д. 9/31, пом. 30-42

Трухина А.Э.



ИНФОРМАЦИЯ

**О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ
ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА, ИЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СТАНОВЯТСЯ
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.**

Номер	результат оказания медицинских услуг, выполнения работ	правила, условия сохранения эффективно го и безопасного результата лечения	Гарантийный срок на достигнуты й лечебный результат	Необходим ые действия по истечению гарантийно го срока результата лечения	возможные последствия бездействия при истечении гарантийного срока результата лечения
1	Микропенная склеротерапия, микросклеро- терапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	увеличение количества ТАЭ, внутрикожных ретикулярных вен

месяцев
после
последней
процедуры,
ограничение
подъема
тяжестей до
10 кг,
ношение
компрессион
ного белья.

2

Стволовая скле- ротерапия

исключение 6 месяцев
солнечного
загара,
посещения
соляриев,
саун и бань
в течение 3
месяцев
после
последней
процедуры,
ограничение
подъема
тяжестей до
10 кг,
ношение
компрессион
ного белья,
прием
флеботонико
в

повторная
процедура
при наличии
показаний

появление новых
варикозно расширенных
вен, увеличение их
количества и размеров,
нарастание явлений
хронической венозной
недостаточности: тяжести
ног в вечернее время и
после рабочего дня, отеки
в вечернее время, кожный
зуд, изменение цвета
кожных покровов,
примечание 1*

3.

ЭВЛК

исключение 12 месяцев
солнечного
загара,
посещения
соляриев,
саун и бань
в течение 3
месяцев
после
процедуры,
ограничение
подъема
тяжестей до
10 кг,
ношение
компрессион
ного белья,
прием

повторная
процедура
при наличии
показаний

появление новых
варикозно расширенных
вен, увеличение их
количества и размеров,
нарастание явлений
хронической венозной
недостаточности: тяжести
ног в вечернее время и
после рабочего дня, отеки
в вечернее время, кожный
зуд, изменение цвета
кожных покровов,
примечание 2*

		флеботони- ко в. Соблюдение лечебно- охранитель- ного режима в послеоперац- ионном периоде			
4	«Тотал» - ЭВЛК	Исключение 12 месяцев посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессион- ного белья, прием флеботони- ко в. Соблюдение лечебно- охранитель- ного режима в послеоперац- ионном периоде	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*	
5	Минифлеб- эктомия	Исключение 12 месяцев посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессион- ного белья, прием флеботони- ко в.	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*	

Соблюдение
лечебно-
охранительн
ого режима в
послеоперац
ионном
периоде

Примечание 1*

- гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- неврологические нарушения: мигренеподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- симптоматический тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия с вероятным развитием летального исхода.

Примечание 2*

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
- Воспаление подкожных вен, лимфоррея и лимфоцеле;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематомы;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоэмболизма,
- летального исхода.